

# Camponotus aethiops



Camponotus aethiops ist eine recht aggressive Camponotus-Art, die in Südeuropa und dem Kaukasus verbreitet ist.

## Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Camponotini
Gattung	Camponotus
Art	Camponotus aethiops
Lebensraum/Heimat	Südeuropa bis zum Kaukasus
Königinnen	monogyn, claustral
Arbeiterinnenunterkasten	Minor-, Media- und Majorarbeiterinnen
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	von Dezember bis Februar bei 12-15°C (hat einen endogenen Rhythmus)
Schwärmzeit	Anfang Juli - Ende August
Aussehen/Färbung	glänzend schwarz;
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Königin: 12 - 13mm Arbeiterin: 5 - 10mm Männchen: 6mm
Koloniegröße	einige 100 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 28 Grad Nestbereich: 21 - 24 Grad. Einige Angaben sprechen von bis zu 30 Grad
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester mit Erdaushub, selten unter Steinen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	Erhöhte Temperatur nötig und wohl längere Entwicklungsdauer.

