

# Camponotus maculatus



Camponotus maculatus ist polymorph. Es werden ähnliche Biotope besiedelt wie Cataglyphis viaticus.

Bei volkreicher Kolonie und günstigen Bedingungen ziemlich aggressiv.



Am Abend und in der Nachtzeit stark zu.



## Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Camponini
Gattung	Camponotus
Untergattung	Camponotus maculatus
Art	Tanaemyrmex

Lebensraum/Heimat	West- bis Ostafrika, bevorzugt Steppe und Trockenwald,
Königinnen	monogyn, claustral
Arbeiterinnenunterkasten	stark polymorph Minor, Media und Major-Arbeiterinnen
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	Diapause Juni/Juli
Schwärmzeit	Ende März bis Anfang April
Aussehen/Färbung	<p>Königinnen: <a href="#">Kopf</a> dunkelbraun bis schwarz, <a href="#">Gaster</a> mattschwarz, Unterseite glänzend schwarz;</p> <p>Arbeiterinnen: <a href="#">Kopf</a> bei größeren Arbeiterinnen dunkelbraun bis schwarz, bei kleineren rötlich;</p> <p><a href="#">Thorax</a> hell bernsteinfarben bis rötlich,</p> <p><a href="#">Gaster</a> mattschwarz, Unterseite glänzend schwarz</p>
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Königinnen: 18-19mm Arbeiterinnen: 6-14mm
Koloniegröße	mehrere 10.000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 30°C Nestbereich: 24- 28°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester, oft unter Steinen
Entwicklungszeiten	Vom Ei bis zur Arbeiterin, 11 Wochen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	Schwierig zum halten da die Temperatur eine wichtige Rolle spielt