

Camponotus micans



[Camponotus micans](#) stammt ursprünglich aus Afrika, ist mittlerweile aber auch in Südeuropa heimisch. Sie bevorzugt trockenere Gebiete. Wie bei anderen [Camponotus](#)-Arten existieren auch hier [Minor](#)-, [Media](#)- und [Major](#)- Arbeiterinnen.

Artenverzeichnis	
Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Camponotini
Gattung	Camponotus
Art	Camponotus micans
Lebensraum/Heimat	Südeuropa bis Nordafrika
Königinnen	monogyn, claustral
Arbeiterinnenunterkasten	stark polymorph Minor, Media und Major-Arbeiterinnen
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	nein, jedoch kann es für die Königin sinnvoll sein die Temperatur von Ende November bis Anfang Februar auf ca. 15 - 18° abzusenken
Aussehen/Färbung	Königin : matt schwarz, Kopf und Gaster reichlich gelblich behaart Arbeiterin : matt schwarz gelblich behaart
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Königinnen: bis 19 mm Arbeiterinnen: 6-15 mm
Koloniegröße	einige 100 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester mit Erdaushub, selten unter Steinen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	Erhöhte Temperatur nötig

Haltungsberichte

<https://ameisencafe.de/cafe/in...d/7368-Camponotus-micans/>

<https://ameisencafe.de/cafe/in...s-micans-Haltungsbericht/>