

# Camponotus rufoglaucus feae

Angeblich ähnelt die Haltung wohl der von *C. ligniperda*, allerdings ganzjährig aktiv und bei dem Ursprungsort entsprechend etwas höheren Temperaturen. Grundsätzlich soll diese Art aber ähnlich robust und einfach zu halten sein.

-

Artenverzeichnis	
Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Camponotini
Gattung	Camponotus Mayr, 1861
Art	Camponotus rufoglaucus feae
Lebensraum/Heimat	Afrika bis Indien ausgeprägt xerotherm, in Steppen und offenem Grasland
Königinnen	monogyn, claustral
Arbeiterinnenunterkasten	stark polymorph Minor-, Media- und Major-Arbeiterinnen
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	keine
Aussehen/Färbung	Königinnen: schwarz, <a href="#">Gaster</a> leicht Weiß/Silbern gestreift <a href="#">Minor-Media</a> : schwarz, <a href="#">Gaster</a> leicht Weiß/Silber gestreift, <a href="#">Major</a> : schwarz, <a href="#">Gaster</a> Silber
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Königinnen: 14-16 mm Arbeiterinnen: 4,5 bis 10 mm Major: 9-10mm
Koloniegröße	einige 100 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm
Nestformen	Bewohnt Erdnester unter Steinen, sowohl in Zypressenwälder wie auch im offenen Gelände.
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	Erhöhte Temperatur nötig
Haltungsberichte	<a href="#">David´s Camponotus rufoglaucus feae</a>