

Crematogaster rogenhoferi



Nisten gerne in Bäumen, Büschen, Baumstümpfen und anderen Tothölzern um Kartonnester anzulegen.

Aggressiv gegen andere [Ameisen](#) und Neststörungen, wobei als Abwehr das Stielchen mit [Gaster](#) senkrecht hochgestreckt wird und das Abwehrsekret der [Ameisen](#) zum Einsatz kommt.

Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Myrmicinae (Knotenameisen)
Tribus	Crematogastrini
Gattung	Crematogaster
Art	Crematogaster rogenhoferi
Lebensraum/Heimat	Südostasien, tropischer Regenwald
Königinnen	claustral, fakultativ polygyn
Arbeiterinnenunterkasten	keine
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	keine
Aussehen/Färbung	beige, Hinterleib braun
Puppen	Nacktpuppen
Körpergröße	Arbeiterinnen: ca. 3-4 mm Königin: ca. 9 - 10mm
Koloniegröße	einige 10.000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 60 - 70% Nestbereich: 60 - 80%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C
Bodengrund Arena	Sand-Lehm
Nestformen	Kartonnester zwischen Ästen.
Entwicklungszeiten	höhere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Einschätzung der
Haltungsschwierigkeit

C. rogenhoferi nistet in geschlossenen Karton-Nestern, somit ist absolut keine Einsicht oder Kontrolle der Vorgänge im Nest möglich. Zu sehen ist in der Haltung also ein grau-braunes Nest und ein paar Arbeiterinnen...