

Ectatomma ruidum



Ectatomma sind große, sehr robuste und auffallende [Ameisen](#), die sich größtenteils [Zoophag](#) ernähren. Ihre Nester bauen sie im Boden. E. [ruidum](#)-Kolonien bestehen meist aus mehreren Hundert Arbeitern.



Artenverzeichnis

| | |
|--------------------------|--|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Ectatomminae |
| Tribus | Ectatommini |
| Gattung | Ectatomma Smith, 1858 |
| Art | Ectatomma ruidum (Roger, 1860) |
| Lebensraum/Heimat | Mittel - und Südamerika, tropischer Regenwald |
| Königinnen | semiclaustral, monogyn, sehr selten polygyn. |
| Arbeiterinnenunterkasten | monomorph |
| Nahrung | Zoophagie und Trophobiose so wie süße Früchte in Haltung |
| Winterruhe | keine |
| Schwärmzeit | Oktober - Dezembe |
| Aussehen/Färbung | Arbeiterinnen: braun-schwarz; gelbe Fühler Spitzen, gekrümmter Gaster Königinnen: braun-schwarz, gekrümmter Gaster Männchen: braun-schwarz |
| Puppen | Kokonpuppen |
| Körpergröße | Arbeiterinnen: 8-12mm Königinnen: 12-14mm Männchen: 8-10mm |

| | |
|---|--|
| Koloniegröße | mehrere 100 Individuen |
| Luftfeuchtigkeit Arena/Nest | Arena: 50 - 70% Nestbereich: 50 - 70% |
| Temperatur Arena/Nest | Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 24- 28°C |
| Bodengrund Arena | Farm: Sand-Lehm, Kork Arena: Sand, Sand-Lehm |
| Nestformen | Erdnester |
| Entwicklungszeiten | Ei -> Larve: 14-16 Tage |
| | Larve -> Puppe: 14-16 Tage |
| | Puppe -> Imago ca. 30 Tage |
| | Gesamt: 58-62 Tage |
| Einschätzung der Haltungsschwierigkeit | höhere Ansprüche an die Klimabedingungen und den Ausbruchsschutz |
| Sonstige Angaben | Diese Art hat einen Wehrstachel der zu allergischen Reaktionen und schlimmeren führen kann?! |