

Formica rufibarbis



F. [rufibarbis](#) sind überwiegend in trockenen und sehr sonnigen Stellen zu finden. Die Eingänge des Nestes sind sehr gut versteckt.

Sie sind sehr aggressiv und furchtlos gegenüber anderen [Ameisen](#).



Artenverzeichnis

| | |
|----------------|---|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Formicinae (Schuppenameisen) |
| Tribus | Formicini |
| Gattung | Formica (Linnaeus, 1758) |
| Untergattung | Serviformica (Forel, 1913) |
| Art | Formica rufibarbis (Fabricius, 1793) |
| Unterart | Formica rufibarbis clarorufibarbis Wheeler & Mann, 1918; Formica rufibarbis kashmirica Starcke, 1935; Formica rufibarbis rufibarbis Fabricius, 1793; Formica rufibarbis subpilosorufibarbis Ruzsky 1905; |
| Deutscher Name | Rotbartige Sklavenameise |

| | |
|--------------------------------|--|
| Lebensraum/Heimat | Europa bis Westsibirien (76° E), planar bis submontan. An nicht zu feuchten Stellen, kurzgrasige oder lückenhafte Trockenrasen, Ackerränder, Feldwege, Sandböden |
| Königinnen | claustral. monogyn und polygyn |
| Arbeiterinnenunterkasten | monomorph, aber deutliche Größenunterschiede |
| Nahrung | überwiegend zoophag, aber auch Honigtau |
| Winterruhe | Ja |
| Schwärmzeit | Ende Juni - Anfang August |
| Aussehen/Färbung | Kopf und Gaster schwarz, Thorax rötlich |
| Puppen | Kokonpuppen |
| Körpergröße | Königinnen: ca. 9-12mm Arbeiterin: ca. 5-7mm Männchen: ca. 9-10mm |
| Koloniegröße | bis einige 1000 Individuen |
| Luftfeuchtigkeit Arena/Nest | Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60% |
| Temperatur Arena/Nest | Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21- 24°C |
| Bodengrund Arena | Farm: Sand - Lehm Arena: Sand - Lehm |
| Nestformen | Erdnester |
| Entwicklungszeiten | vom Ei bis zum erwachsenen Tier vergehen ca. 8 - 10 Wochen |
| Sonstige Angaben | Formica rufibarbis ist eine Schwesternart von Formica cunicularia und Formica clara. Eine Unterscheidung ist recht schwierig. |