

# Lasius alienus



Warme, trockene und gering bewachsene Stellen. Vorkommen häufig in lichten Eichenkrüppelwäldern und auf Trocken- und Halbtrockenrasen auf Kalk. Von Spanien bis Kasachstan (85°E), in Skandinavien bis 55,3°N. Kommt bis auf Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in ganz Deutschland vor, nur südlich von 53°N weit verbreitet.

Diese Art wird oft mit [Lasius niger](#) verwechselt, da sie sehr Ähnlich aussieht. Sie kann aber mithilfe ihrer kleineren Körpergröße unterschieden werden.

Da die Tiere ihr Nest fast überall in Wäldern, Gärten und in Städten bauen, kann nahezu jedes [Formicarium](#) für die Tiere verwendet werden.



## Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Lasiini
Gattung	Lasius (Fabricius, 1804)
Untergattung	Lasius s. str. (Fabricius, 1804)
Art	Lasius alienus (Förster, 1850)
Deutscher Name	Fremde Wegameise

Lebensraum/Heimat	Warme, trockene und gering bewachsene Stellen. Vorkommen häufig in lichten Eichenkrüppelwäldern und auf Trocken- und Halbtrockenrasen auf Kalk. Von Spanien bis Kasachstan (85°E), in Skandinavien bis 55,3°N. Kommt bis auf Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in ganz Deutschland vor, nur südlich von 53°N weit verbreitet.
Königinnen	claustral aber auch Pleometrose oder Adoption sind möglich, monogyn
Arbeiterinnenunterkasten	Nein, monomorph
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Ende Juni bis Ende August
Aussehen/Färbung	Arbeiterinnen: dunkelbraun, eine fein silbrige Behaarung, Beine heller Königinnen: dunkelbraun bis grauschwarz und matt, die Körperbehaarung schimmert grau Männchen: dunkelbraun
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Arbeiterinnen: ca. 2 - 4 mm Königinnen: ca. 7 - 9 mm Männchen: ca. 3 - 4 mm
Koloniegröße	bis ca. 40.000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21 - 24°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester häufig in Wegspalten oder unter Steinen, teilweise in morschem Holz
Entwicklungszeiten	Vom Ei bis zum erwachsenen Tier vergehen ca. 10 - 12 Wochen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	einfach zu Halten
Sonstige Angaben	Verwechslungsgefahr mit <i>L. psammophilus</i> oder <i>L. paralienus</i>