

Lasius alienus



Warme, trockene und gering bewachsene Stellen. Vorkommen häufig in lichten Eichenkrüppelwäldern und auf Trocken- und Halbtrockenrasen auf Kalk. Von Spanien bis Kasachstan (85°E), in Skandinavien bis 55,3°N. Kommt bis auf Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in ganz Deutschland vor, nur südlich von 53°N weit verbreitet.

Diese Art wird oft mit [Lasius niger](#) verwechselt, da sie sehr Ähnlich aussieht. Sie kann aber mithilfe ihrer kleineren Körpergröße unterschieden werden.

Da die Tiere ihr Nest fast überall in Wäldern, Gärten und in Städten bauen, kann nahezu jedes [Formicarium](#) für die Tiere verwendet werden.



Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Lasiini
Gattung	Lasius (Fabricius, 1804)
Untergattung	Lasius s. str. (Fabricius, 1804)
Art	Lasius alienus (Förster, 1850)
Deutscher Name	Fremde Wegameise

Lebensraum/Heimat	Warme, trockene und gering bewachsene Stellen. Vorkommen häufig in lichten Eichenkrüppelwäldern und auf Trocken- und Halbtrockenrasen auf Kalk. Von Spanien bis Kasachstan (85°E), in Skandinavien bis 55,3°N. Kommt bis auf Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in ganz Deutschland vor, nur südlich von 53°N weit verbreitet.
Königinnen	claustral aber auch Pleometrose oder Adoption sind möglich, monogyn
Arbeiterinnenunterkasten	Nein, monomorph
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Ende Juni bis Ende August
Aussehen/Färbung	Arbeiterinnen: dunkelbraun, eine fein silbrige Behaarung, Beine heller Königinnen: dunkelbraun bis grauschwarz und matt, die Körperbehaarung schimmert grau Männchen: dunkelbraun
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Arbeiterinnen: ca. 2 - 4 mm Königinnen: ca. 7 - 9 mm Männchen: ca. 3 - 4 mm
Koloniegröße	bis ca. 40.000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21 - 24°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester häufig in Wegspalten oder unter Steinen, teilweise in morschem Holz
Entwicklungszeiten	Vom Ei bis zum erwachsenen Tier vergehen ca. 10 - 12 Wochen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	einfach zu Halten
Sonstige Angaben	Verwechslungsgefahr mit <i>L. psammophilus</i> oder <i>L. paralienus</i>