

| | |
|---|---|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Formicinae (Schuppenameisen) |
| Tribus | Lasiini |
| Gattung | Lasius Fabricius, 1804 |
| Art | Lasius emarginatus (Olivier, 1792) |
| Lebensraum/Heimat | gerne altes Totholz, Gebälk von Häusern, Mauerspalt, Felsbiotope in Rissen und Spalten, unter Steinen. Mittel- und Südeuropa |
| Königinnen | claustral, monogyn |
| Arbeiterinnenunterkasten | Nein, monomorph |
| Nahrung | Insekten, Honigtau, Elaiosomen |
| Winterruhe | Ja |
| Schwärmzeit | Juni - August |
| Aussehen/Färbung | rotgelber bis rotbrauner Thorax , Kopf und Gaster dunkel |
| Puppen | Kokonpuppen |
| Körpergröße | Königinnen: 7-9mm Arbeiterinnen: 2,5-4,5mm Männchen: 3,5-4,5mm |
| Koloniegröße | mehrere 1000 Individuen |
| Luftfeuchtigkeit Arena/Nest | Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60% |
| Temperatur Arena/Nest | Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21- 24°C |
| Bodengrund Arena | Farm: Sand - Lehm Arena: Sand - Lehm |
| Nestformen | Aufgrund der Vorliebe von Lasius emarginatus zu Gestein bieten sich hier Ytong- und Gipsnester besonders an, auch in Kombination mit einem Holznest. Farmen und Erdnester hingegen sind nicht gut geeignet und werden vermutlich auch gar nicht angelegt. |
| Einschätzung der Haltungsschwierigkeit | Siedelt auch in morschen und intakten Balken von Häusern und kann dort große Schäden anrichten! |
| Sonstige Angaben | Die Wärme und Trockenheit liebende Lasius emarginatus ist äußerst dominant und aggressiv und anderen Ameisenarten an warmen Standorten überlegen. |