

Lasius niger



Ein *Lasius niger* Volk kann bis zu 40.000 Individuen groß werden, jedes Individuum kann bis zu 4 Jahre alt werden, allerdings hat sich bei mir eine Lebensdauer von 2-3 Jahren eher bestätigt. *Lasius niger* Königinnen bzw. Kolonien können sehr alt werden. Im Labor hat es eine *Gyne* auf 28 3/4 Jahre gebracht. Theoretisch ist das in der Haltung auch möglich, es hat bis jetzt aber noch niemand gesch



Lasius [niger](#) - die Einsteigerart schlechthin. Sie ist einfach zu halten, legt ein schnelles Volkswachstum an den Tag und eine hohe Aktivität

Lasius [niger](#) sind äußerst nesttreu, auch wenn das alte Nest trocken, dreckig oder schimmelig ist. Nicht selten leben sie so lange wie nur möglich in dem alten Nest, ehe sie ins neue Nest ziehen. Mit Erwärmung des neuen Nestes um 1-2 Grad (nicht mehr!) kann man gut nachhelfen, eine Schlauchkürzung oder Direktanschließung des [RG](#)'s/alten Nestes ist ebenso hilfreich.

| Artenverzeichnis | |
|---|--|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Formicinae (Schuppenameisen) |
| Tribus | Lasiini |
| Gattung | Lasius Fabricius, 1804 |
| Untergattung | Lasius s. str. Fabricius, 1804 |
| Art | Lasius niger (Linnaeus, 1758) |
| Unterart | Lasius niger niger (Linnaeus, 1758); Lasius niger pinetorum Ruszky, 1907 |
| Deutscher Name | Schwarze Wegameise |
| Lebensraum/Heimat | nicht zu trockene Orte z.B: Wiesen, Gärten und Waldränder. Europa (weit verbreitet) |
| Königinnen | claustral, bis 25% in Pleometrose, monogyn |
| Arbeiterinnenunterkasten | Nein, monomorph |
| Nahrung | tote Insekten, Honigtau von Blattläusen (Trophobie) |
| Winterruhe | Ja |
| Schwärmzeit | Ende Juni bis Anfang September. Hauptschwärmzeit von Mitte Juli bis Anfang August; nachmittags |
| Aussehen/Färbung | dunkelbraun bis schwarzbraun. Ziemlich dichte, silbrige Behaarung, dazwischen einzelne längere Haare. |
| Puppen | Kokonpuppen |
| Körpergröße | Königinnen: ca. 8-9mm Arbeiterinnen: ca. 3-5mm Männchen: ca. 3,5-4,5mm |
| Koloniegröße | bis ca. 40.000 Individuen |
| Luftfeuchtigkeit Arena/Nest | Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60% |
| Temperatur Arena/Nest | Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21 - 24°C |
| Bodengrund Arena | Farm: Sand-Lehm Arena: Sand-Lehm |
| Nestformen | Erdnester häufig in Wegspalten oder unter Steinen, teilweise in morschem Holz |
| Entwicklungszeiten | Ei zu Larve: ca. 10-15 Tage Larve zu Puppe: ca. 10-15 Tage Puppe zu Imago: 10 - 25 Tage Insgesamt: 1 - 1,5 (manchmal auch bis 2) Monate |
| Einschätzung der Haltungsschwierigkeit | einfach zu haltende Ameisenart, die aber mit einer gewissen Größe einiges an Ausbruchsschutz verlangt.? |

Sonstige Angaben

Sie ist für unerfahrene Halter leicht mit *Formica fusca* zu verwechseln, diese sind jedoch größer und lassen nach der Nahrungsaufnahme auf dem Hinterleib helle Streifen erkennen.

Haltungsberichte

[Haltungsbericht Lasius niger von fink2](#)

[Micky's Lasius niger](#)