

Lasius niger



Ein *Lasius niger* Volk kann bis zu 40.000 Individuen groß werden, jedes Individuum kann bis zu 4 Jahre alt werden, allerdings hat sich bei mir eine Lebensdauer von 2-3 Jahren eher bestätigt. *Lasius niger* Königinnen bzw. Kolonien können sehr alt werden. Im Labor hat es eine *Gyne* auf 28 3/4 Jahre gebracht. Theoretisch ist das in der Haltung auch möglich, es hat bis jetzt aber noch niemand gesch



Lasius [niger](#) - die Einsteigerart schlechthin. Sie ist einfach zu halten, legt ein schnelles Volkswachstum an den Tag und eine hohe Aktivität

Lasius [niger](#) sind äußerst nesttreu, auch wenn das alte Nest trocken, dreckig oder schimmelig ist. Nicht selten leben sie so lange wie nur möglich in dem alten Nest, ehe sie ins neue Nest ziehen. Mit Erwärmung des neuen Nestes um 1-2 Grad (nicht mehr!) kann man gut nachhelfen, eine Schlauchkürzung oder Direktanschließung des [RG](#)'s/alten Nestes ist ebenso hilfreich.

Artenverzeichnis	
Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Lasiini
Gattung	Lasius Fabricius, 1804
Untergattung	Lasius s. str. Fabricius, 1804
Art	Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Unterart	Lasius niger niger (Linnaeus, 1758); Lasius niger pinetorum Ruszky, 1907
Deutscher Name	Schwarze Wegameise
Lebensraum/Heimat	nicht zu trockene Orte z.B: Wiesen, Gärten und Waldränder. Europa (weit verbreitet)
Königinnen	claustral, bis 25% in Pleometrose, monogyn
Arbeiterinnenunterkasten	Nein, monomorph
Nahrung	tote Insekten, Honigtau von Blattläusen (Trophobie)
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Ende Juni bis Anfang September. Hauptschwärmzeit von Mitte Juli bis Anfang August; nachmittags
Aussehen/Färbung	dunkelbraun bis schwarzbraun. Ziemlich dichte, silbrige Behaarung, dazwischen einzelne längere Haare.
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Königinnen: ca. 8-9mm Arbeiterinnen: ca. 3-5mm Männchen: ca. 3,5-4,5mm
Koloniegröße	bis ca. 40.000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21 - 24°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester häufig in Wegspalten oder unter Steinen, teilweise in morschem Holz
Entwicklungszeiten	Ei zu Larve: ca. 10-15 Tage Larve zu Puppe: ca. 10-15 Tage Puppe zu Imago: 10 - 25 Tage Insgesamt: 1 - 1,5 (manchmal auch bis 2) Monate
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	einfach zu haltende Ameisenart, die aber mit einer gewissen Größe einiges an Ausbruchsschutz verlangt.?

Sonstige Angaben

Sie ist für unerfahrene Halter leicht mit *Formica fusca* zu verwechseln, diese sind jedoch größer und lassen nach der Nahrungsaufnahme auf dem Hinterleib helle Streifen erkennen.

Haltungsberichte

[Haltungsbericht Lasius niger von fink2](#)

[Micky´s Lasius niger](#)