

Myrmica sabuleti



Diese Art bevorzugt trockene, steinige Gebiete mit wenig Pflanzenwuchs, wurde aber auch schon in sehr feuchten Gegenden (z.B. Mooren) gefunden. Die Nester werden mit Vorliebe unter Steinen angelegt. *M. sabuleti* ist nur wenig wehrhaft.

-

Artenverzeichnis	
Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Myrmicinae (Knotenameisen)
Tribus	Myrmicini
Gattung	Myrmica
Art	Myrmica sabuleti
Deutscher Name	Säbeldornige Knotenameise
Lebensraum/Heimat	Europa, Asien
Königinnen	semiclaustral, polygyn
Arbeiterinnenunterkasten	Nein, monomorph
Nahrung	Honigtau, Insekten
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Juli - September
Aussehen/Färbung	rotbraun; vordere Kopffläche u. Gaster dunkelbraun;
Puppen	Keine Angabe
Körpergröße	Arbeiterinnen: 4-4,5mm; Königinnen: 5-6mm; Männchen: 5-6mm;
Koloniegröße	selten mehr als 1000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 70%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21- 24°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm, Humus Arena: Sand, Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester, unter Steinen
Entwicklungszeiten	vom Ei zur Arbeiterin ca. 10 - 12 Wochen

Einschätzung der
Haltungsschwierigkeit

einfach zu Halten

Sonstige Angaben

Die Art sticht bei Gefahr, was dem Brennen einer Brennessel entsprechen kann.