

Paraponera clavata



Diese Art lebt in der Erde am Rand von Urwaldbäumen, läuft aber auch gerne auf Bäume, um zu jagen. Dabei laufen sie ruhig und elegant. *P. clavata* ist nicht sehr aggressiv und lässt sich sogar auf die Hand nehmen. Bei Neststörung können sie sich jedoch verteidigen und machen Gebrauch von ihrem Giftstachel.



chene Person angeblich 24 Stunden lang Schmerzen hat. In bei einem Bienen oder Wespenstich



Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Paraponerinae
Tribus	Paraponerini
Gattung	Paraponera
Art	Paraponera clavata
Lebensraum/Heimat	Amazonasdelta und andere Gebiete, die diesem Gebiet ähneln - Nester vorwiegend in der Nähe eines Baumstrunkes Mittel- und Südamerika (Atlantische Küste von Süd- bis Zentralamerika einschl. Costa Rica)
Königinnen	clausal, monogyn
Arbeiterinnenunterkasten	monomorph, aber mit deutlichen Größenunterschieden.
Nahrung	80-90% Kohlenhydrate in Form von Nektar, restliche Nahrung Insekten
Winterruhe	keine
Schwärmzeit	mit Beginn der Regenzeit

Aussehen/Färbung	Königinnen: schwarzer Thorax , manchmal bräunlich; Vorderbeine goldfarben; Körper & Beine behaart; Arbeiterinnen: ähnlich der Königin , nur etwas schlanker am Thorax ;
Puppen	Nacktpuppen
Körpergröße	Königinnen: 25-30 mm Arbeiterinnen: 18-25 mm
Koloniegröße	durchschnittlich 500 Individuen. Kolonien können jedoch mehr als 2000 Tiere haben
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 30 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 25- 30°C
Bodengrund Arena	Sand, Sand-Lehm, Humus
Nestformen	Erdnester, Farm mit entsprechendem Substrat