


Strongylognathus testaceus



Strongylognathus [testaceus](#) ist ein Sozialparasit bei [Tetramorium caespitum](#). Die [Königin](#) dringt in ein [T. caespitum](#)-Nest ein, tötet die Wirtskönigin aber nicht! Stattdessen wird die Geschlechtstierproduktion des Wirtes abermassal unterdrückt. Der Anteil von [S. testaceus](#) an der gesamten Nestpopulation ist oft kleiner



Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Agroecomyrmecinae
Tribus	Crematogastrini (ehem. Tetramoriini)

Gattung	Strongylognathus
Art	Strongylognathus testaceus
Lebensraum/Heimat	Europa bis Westsibirien; trockene Standorten (bei T. caespitum)
Königinnen	Die Königin dringt in ein T. caespitum-Nest ein, tötet die Wirtskönigin aber nicht! Stattdessen wird die Geschlechtstierproduktion des Wirtes pheromonal unterdrückt. monogyn
Arbeiterinnenunterkasten	monomorph
Nahrung	werden von Wirtsameisen gefüttert
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Ende Juni - Ende August
Aussehen/Färbung	Arbeiterinnen gelbbraun bis rotbraun; Königinnen und Männchen dunkler;
Puppen	Keine Angabe
Körpergröße	Arbeiterinnen: 2-3,6 mm; Königinnen: 3,5-3,8 mm; Männchen: 3,2-4 mm;
Koloniegröße	Die Nester der Wirtsart können einige tausend Individuen sein.
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	-
Temperatur Arena/Nest	-
Entwicklungszeiten	Entsprechend der Wirtsart.
Sonstige Angaben	stark gefährdet, von einer Entnahme aus der Natur sollte abgesehen werden.