

Tapinoma nigerrimum

Diese anspruchslose, aber wärmeliebende Ameisenart, welche durch chemische Abwehr feindliche [Ameisen](#) in die Flucht schlägt (aus diesem Grund ist sie sehr wehrhaft im Streit mit anderen [Ameisen!](#)), ist sehr volkreich sowie [polygyn](#).

| Artenverzeichnis | |
|---|--|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Dolichoderinae (Drüsenameisen) |
| Tribus | Dolichoderini |
| Gattung | Tapinoma |
| Art | Tapinoma nigerrimum |
| Lebensraum/Heimat | xerotherme Trockenrasen und Ruderalflächen; Südeuropa, Zentralasien |
| Königinnen | monogyn und polygyn; claustral |
| Arbeiterinnenunterkasten | monomorph |
| Nahrung | Hauptsächlich Insekten, Honigtau |
| Winterruhe | Ja |
| Schwärmzeit | April bis Mai, Begattung erfolgt am Boden |
| Aussehen/Färbung | Königinnen: glänzend schwarz; etwas größer als Arbeiterinnen Arbeiterinnen: glänzend schwarz; klein (besitzt Ähnlichkeit mit Lasius niger) |
| Puppen | Keine Angabe |
| Körpergröße | Königin: 5 - 6mm Arbeiterin: 3 - 5mm Männchen: 4 - 4,5mm |
| Koloniegröße | mehrere 1000 Individuen |
| Luftfeuchtigkeit Arena/Nest | Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 70% |
| Temperatur Arena/Nest | Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21- 24°C |
| Bodengrund Arena | Sand-Lehm, Humus, Holz |
| Nestformen | Erdnester zwischen Pflanzenstengeln und unter Steinen |
| Einschätzung der Haltungsschwierigkeit | neigen zu starken Wanderbewegungen während der Saison, daher guter Ausbruchsschutz wichtig , |
| Sonstige Angaben | gilt in manchen Regionen als invasiv |
| Externe Informationen | https://www.natur-und-landscha...-der-gattung-tapinoma-590 |