

Plagiolepis pallescens.

Laut Bolten wurde sie auch als Junior Synonym [Plagiolepis vindobonensis](#) benannt.

Artenverzeichnis	
Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Plagiolepidini
Gattung	Plagiolepis
Art	Plagiolepis pallescens.
Lebensraum/Heimat	Europa; vor allem auf kalkhaltigen Trockenrasen
Königinnen	claustral, monogyn oder polygyn
Arbeiterinnenunterkasten	monomorph, teilweise Arbeiterinnen mit stark ausgebreiteten Hinterleib.
Nahrung	nektarivor, trophobiotisch
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Mitte Juni - Mitte August
Aussehen/Färbung	Königinnen: schwarz bis schwarzbraun; Mandibeln , Fühlerschäfte und Ränder der Gastralsegmente rötlich; Geißel und Beine bräunlich; Arbeiterinnen: tief dunkelbraun; Oberkiefer, Beine und Fühler gelbbraun; Schenkel und Fühlergeißel vom zweiten Glied an verdunkelt; glatt und glänzend;
Puppen	Keine Angabe
Körpergröße	Königinnen: 4,5-5mm; Arbeiterinnen: 2-2,5mm;
Koloniegröße	mehrere 1000 Individuen
Temperatur Arena/Nest	keine Angabe
Entwicklungszeiten	ca.4 Wochen
Sonstige Angaben	Die Art gilt in Mitteleuropa als gefährdet.